


DERMATOLOGÍA EN IMÁGENES

Linfoma cutáneo de células T diseminado: Dermatología en Imágenes

Javier Rosero,* Carolina Narváez,** Carmen Santamaría***



Hombre de 56 años presenta lesiones cutáneas generalizadas de 2 años de evolución, cuyo inicio fue con máculas eritematosas pruriginosas, que progresaron a placas y tumores. Refiere pérdida de peso, sudoración nocturna ocasional y prurito intenso. La exploración revela múltiples lesiones nodulares eritematovioláceas, algunas ulceradas en la espalda, y adenopatías cervicales y axilares bilaterales.

La biopsia cutánea muestra infiltrado linfocítico atípico con epidermotropismo. La TC evidencia adenopatías generalizadas. Se diagnostica linfoma cutáneo de células T, estadio IVA (T3 N3 Mo B2).

Este caso ilustra la progresión característica de un linfoma cutáneo avanzado. El diagnóstico se basa en la correlación clínico-patológica. El tratamiento es desafiante y generalmente paliativo, incluyendo terapias sistémicas como interferón y quimioterapia en casos refractarios o **avanzados**. La presentación clínica es variable y el curso impredecible. Se enfatiza la importancia del abordaje multidisciplinario y seguimiento a largo plazo para optimizar el manejo, con-

siderando la complejidad de la enfermedad y su impacto en la calidad de vida del paciente.

ORCID: Javier Rosero <https://orcid.org/0000-0002-3635-6653>

¹Bagherani N, Smoller BR. An overview of cutaneous T cell lymphomas. *F1000Res* [Internet]. 2016 Sep 1 [cited 2023 Jun 25];5 Faculty Rev-1882. Available from: <https://f1000research.com/articles/5-1882/v1> doi: 10.12688/f1000research.8829.1

²Wilcox RA. Cutaneous T-cell lymphoma: 2017 update on diagnosis, risk-stratification, and management. *Am J Hematol* [Internet]. 2017 Oct [cited 2023 Jun 25];92(10):1085-1102. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.24876> doi: 10.1002/ajh.24876

³Jawed SI, Myskowski PL, Horwitz S, Moskowitz A, Querfeld C. Primary cutaneous T-cell lymphoma (mycosis fungoides and Sézary syndrome): part I. Diagnosis: clinical and histopathologic features and new molecular and biologic markers. *J Am Acad Dermatol* [Internet]. 2014 Feb [cited 2023 Jun 25];70(2):205.e1-16. Available from: [https://www.jaad.org/article/S0190-9622\(13\)01087-9/fulltext](https://www.jaad.org/article/S0190-9622(13)01087-9/fulltext) doi: 10.1016/j.jaad.2013.07.049

⁴Trautinger F, Eder J, Assaf C, Bagot M, Cozzio A, Dummer R, et al. European Organisation for Research and Treatment of Cancer consensus recommendations for the treatment of mycosis fungoides/Sézary syndrome - Update 2017. *Eur J Cancer* [Internet]. 2017 May [cited 2023 Jun 25];77:57-74. Available from: [https://www.ejca.com/article/S0959-8049\(17\)30204-3/fulltext](https://www.ejca.com/article/S0959-8049(17)30204-3/fulltext) doi: 10.1016/j.ejca.2017.02.027

* Residente del primer año de Dermatología, Universidad UTE

***Servicio de Dermatología, Novaclínica Santa Cecilia, Quito - Ecuador.

*** Dermatóloga y Jefa de Servicio de Dermatología, Novaclínica Santa Cecilia, Quito, Ecuador

Correspondencia: javier.rosero94@gmail.com

Cómo citar este artículo: Rosero Caiza JA, Narváez Álvarez CM, Santamaría Burgos C. Linfoma cutáneo de células T diseminado: Dermatología en Imágenes. *Rev Dermatol Cent Úraga*. 2025;7(1).

Fecha de recepción: 15/07/2024

Fecha de aceptación: 25/11/2024