


## DERMATOLOGÍA EN IMÁGENES

# El carcinoma camaleón: Cuando un carcinoma basocelular se disfraza de enfermedad de Bowen

José Plata,<sup>\*</sup> Javier Rosero,<sup>\*</sup> Santiago Palacios,<sup>\*\*</sup> Gabriela Zumárraga,<sup>\*\*\*</sup>  
Johanna Brito,<sup>\*\*\*\*</sup> Doménica Lara<sup>\*\*\*\*\*</sup>



Femenina de 74 años de edad, acude al servicio de Dermatología por presentar una lesión de 1 año de evolución, la cual ha ido creciendo y presenta sangrado esporádico. Al examen físico encontramos una placa eritematosa y queratinocítica de aproximadamente 1cm x 1.5cm de diámetro, localizada en la cara externa de

la pierna izquierda (Figura 1). En la dermatoscopia se observa una lesión no melanocítica que presenta vasos puntiformes radiales, con presencia de costra amarillenta en uno de sus extremos, y zonas blanquecinas sin estructura (Figura 2).

<sup>\*</sup> Servicio de Dermatología, Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), Quito, Ecuador  
<sup>\*\*</sup> Servicio de Dermatología, Centro de la Piel (CEPI), Quito, Ecuador  
<sup>\*\*\*</sup> Práctica Privada en Salud Ocupacional, Quito, Ecuador  
<sup>\*\*\*\*</sup> Servicio de Dermato-Patología, Centro de la Piel (CEPI), Quito, Ecuador  
<sup>\*\*\*\*\*</sup> Estudiante de Medicina en Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Quito, Ecuador

Autor de correspondencia  
Dr. José Alfredo Plata López  
Quito, Ecuador.  
japl1994@hotmail.com  
Teléfono: 0999709118

Se decide la realización de una biopsia incisional de la lesión y se obtiene el siguiente reporte: Piel cubierta por costra serohemática, con acúmulos de polimorfo-nucleares y detritus celulares. Presencia de neoplasia maligna de estirpe epitelial, constituida por células basaloideas atípicas que presentan un patrón de crecimiento cribiforme, muestran empalizada periférica, retracción peritumoral y cambio mixoide del estroma (Figura 3).

El carcinoma basocelular (CBC) es el cáncer de piel más común, conocido por su crecimiento lento y baja probabilidad de metástasis. Se desarrolla en las células basales de la epidermis y puede presentarse en diversas formas como nodular, superficial, pigmentado y morfeiforme. Aunque suele ser indolente, puede ser localmente invasivo y causar daños si no se trata adecuadamente.<sup>1</sup>

El CBC superficial puede parecerse a la enfermedad de Bowen (carcinoma escamoso in situ),<sup>2</sup> complicando el diagnóstico debido a sus similitudes clínicas. Herramientas como la dermatoscopia y la microscopía con focal de reflectancia ayudan a distinguir entre ambas condiciones.<sup>3</sup> La dermatoscopia del CBC superficial muestra un fondo amarillo-rojo con puntos azul-gris y vasos dendríticos, mientras que la enfermedad de Bowen presenta atipia queratinocítica,<sup>4</sup> patrón desestructurado de color marrón, y vasos sanguíneos visibles.<sup>5</sup>

## CONSENTIMIENTO INFORMADO

El paciente incluido en este estudio ha firmado el consentimiento informado, aprobando el uso de sus imágenes y datos clínicos exclusivamente con fines de investigación y publicación científica. Se garantiza que no se han proporcionado datos personales ni se han utilizado fotografías que permitan su identificación.

## BIBLIOGRAFÍA

1. Monteagudo Alvarez J, et al. Este Artículo Está Bajo Licencia de Creative Commons. vol. 25 (2021). Disponible en: <https://orcid.org/0000-0003-0751.981X>.
2. Hasbún Acuña P, Cullen Aravena R, Maturana Donaire C, Ares Mora R, Porras Kusmanic N. Pigmented basal cell carcinoma mimicking a superficial spreading melanoma. *Medwave*. 2016;16:e6805.
3. Chen KJ, Wang ZY, Han Y, Cui Y. Superficial basal cell carcinoma mimicking Bowen's disease: Diagnosis with noninvasive imaging. *Skin Res Technol*. 2023;29. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/srt.13316>.
4. Scalvenzi M, Villani A, Mazzella C, Fabbrocini G, Costa C. Cutaneous Bowen's disease: An analysis of 182 cases according to age, sex, and anatomical site from an Italian center. *Open Access Maced J Med Sci*. 2019;7:696-697. Disponible en: <https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.123>.
5. Cox NH, Eedy DJ, Morton CA. Guidelines for Management of Bowen's Disease. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. 2021.

## ORCID

José Plata  <https://orcid.org/0009-0006-5971-4886>

---

Cómo citar este artículo: Plata J, Rosero J, Palacios S, Zumárraga G, Brito Luna J, Lara D. "El carcinoma camaleón: Cuando un carcinoma basocelular se disfraza de enfermedad de Bowen - Dermatología en Imágenes. *Rev Dermatol Cent Úraga*. 2025;7(2).

Fecha de recepción: 10/02/2025  
Fecha de aceptación: 18/02/2025