


DERMATOLOGÍA EN IMÁGENES

Fibroqueratoma Subungueal.

Dra. Andrea Lubkov

Paciente femenina 56 años presenta desde hace 4 años pápula filiforme subungueal, de 3mm de ancho, asintomática, en el cuarto dedo de la mano izquierda, sin antecedentes de traumatismo. A la dermatoscopia se observa pápula digitiforme, que emerge desde el lecho ungueal y sobrepasa el borde libre ungueal, con una base ancha eritematosa y extremo distal de aspecto hiperqueratósico. Se realiza excéresis, en la que se observa tumor que nace desde la matriz ungueal y atraviesa longitudinalmente el lecho. El estudio histopatológico concluye Fibroqueratoma Ugueal.

El fibroqueratoma ungueal es un tumor fibroso adquirido de los dedos. Su etiología se desconoce, aunque se sugiere un origen traumático.



Clínicamente se observa como una pápula color piel ó eritematosa, en forma de domo o digitiforme, que puede acompañarse de alteraciones del plato ungueal.

En la dermatoscopia se han descrito varios hallazgos según la localización y forma del tumor, pero coinciden en la presencia de un área blanquecina hiperqueratósica y otra área eritematosa compuesta por vasos. Se lo clasifica según su localización en 5 tipos; 1p. pliegue proximal; Im. dermis debajo de matriz ungueal; Ib. lecho ungueal; IIp. dermis del dorso de la falange distal; III. Pliegue ungueal lateral. Existe otra clasificación que los divide en: periungueal, intraungueal y subungueal. El tratamiento consiste en la excéresis completa del tumor.