

DERMATOLOGÍA EN IMÁGENES

Retroniquia

P. Chang*



Paciente femenina de 15 años que es enviada a una interconsulta por lesión de la primera uña pie izquierdo de 2 meses de evolución, la cual inició después de haberse golpeado con la pata de una cama con enrojecimiento y aparición de material rojizo debajo de la cutícula recibiendo múltiples antibióticos sin obtener ningún alivio. A la evaluación se observa una onicopatía localizada al pliegue proximal con la presencia de un tejido de granulación debajo del mismo y onicólisis con estos datos se hace el diagnóstico de retroniquia y se le realizó avulsión del plato ungueal.

La retroniquia es el enterramiento o encajamiento de la uña a nivel del pliegue proximal, la palabra deriva del latín retro que significa hacia atrás y del griego oniquia que significa uña. Es una onicopatía del aparato ungueal que puede manifestarse como una paroniquia proximal.

Hay una pérdida de la continuidad de la uña y la matriz ungueal como resultado de un trauma distal permaneciendo adherida al lecho ungueal lo cual produce un encajamiento de la uña hacia el pliegue proximal causando inflamación del mismo y no permite que la uña siga su crecimiento normal. Se ven en los dedos de los pies y con menor frecuencia en los dedos pulgares e índices.

Para el diagnóstico debe de ser tomado en cuenta engrosamiento de la uña, paroniquia crónica dolorosa y el tejido de granulación debajo del pliegue proximal.

El tratamiento de la retroniquia es la avulsión del plato ungueal

*Dermatóloga, Hospital General de Enfermedades IGSS
Correspondencia: pchang2622@gmail.com

Fecha de recepción: 10-10-2020
Fecha de aceptación: 28-10-2020
Fecha de publicación:

IMAGES IN DERMATOLOGY

Rhetronychia

P. Chang*



A 15-year-old female patient referred for consultation for a 2-month-old injury to the first nail of the left foot, which began, after hitting the leg of a bed, with redness and the appearance of reddish material under the cuticle. The patient received multiple antibiotics without getting any relief. On evaluation, a localized onychopathy was observed in the proximal fold with the presence of granulation tissue underneath it and onycholysis. With these data, the diagnosis of retronychia was made and avulsion of the nail plate was performed.

The retronychia is the burial or engagement of the nail at the level of the proximal fold. The word derives from the Latin retro, which means backwards, and from the Greek onychia, which means nail. This onychopathy of the nail apparatus can manifest as a proximal paronychia.

There is loss of continuity of the nail and the nail matrix resulting of a distal trauma, adhered to the nail bed, which produces an engagement of the nail towards the proximal fold that causes inflammation of the same and does not allow the nail to continue its normal growth. It is normally found on the toes and is less frequent on the thumbs and index fingers.

For the diagnosis, nail thickening, chronic painful paronychia, and granulation tissue under the proximal fold must be taken into account.

The treatment for retronychia is avulsion of the nail plate.

*Dermatologist, Social Security General Hospital (IGGS)
Corresponding author: pchang2622@gmail.com

Date of receipt: 10-10-2020
Date of acceptance: 28-10-2020
Date of publication: