



DERMATOLOGÍA EN IMÁGENES

Criptococosis cutánea primaria

María Fernanda Ordóñez-Rubiano, María Claudia Rodríguez Galvis



Un hombre de 37 años con VIH presentó una historia de 6 semanas de traumatismo con un palo de madera en el codo izquierdo, desarrolló una pápula asintomática que se agrandó progresivamente con nuevas pápulas en la periferia. Su recuento de células T CD4+ en sangre era de 1/mm³ y su carga viral era de 158,894 copias. En la exploración física estaba febril, tenía una adenomegalia en la axila izquierda y presentaba una placa umbilicada de color carne, infiltrada, con una costra hemorrágica central y múltiples pápulas de similares características en la periferia (panel A). La biopsia de la placa reveló formas de levadura encapsuladas (panel B, flechas negras; tinción de mucicarmina, ×100), y se cultivó *Cryptococcus neoformans* del tejido. Tres semanas después, el paciente desarrolló una meningitis criptocócica y recibió tratamiento con Anfotericina B liposomal más flucitosina, observándose una mejora de las lesiones cutáneas.



*Dermatologist, Social Security General Hospital (IGGS)
Corresponding author: mariaclaudiar3@gmail.com

Date of receipt: 27-09-2021
Date of acceptance: 10-10-2021
Date of publication: